


Lesões tendíneas dos quirodáctilos - correlação da imagem com achados clínicos e cirúrgicos

Complexo flexor dos dedos







2º - 5º dedos - usualmente 5 polias anelares e 3 cruciformes:

- A1 - A5 - fixam os tendões às falanges
- X - cruciformes - mais frouxas, permitem flexibilidade à bainha

Lesões tendíneas dos quirodáctilos - correlação da imagem com achados clínicos e cirúrgicos

Lesão de 'Jersey Finger'


Masculino, 35 anos, praticante de luta, com dor no quarto quirodáctilo após 'mal jeito' durante prática esportiva. À ressonância magnética: lesão transfixante no tendão flexor profundo, sem avulsão óssea associada.



T2 - FAT SAT

Lesões tendíneas dos quirodáctilos - correlação da imagem com achados clínicos e cirúrgicos

(A,B) Masculino, jovem, com lesão transfixante no tendão flexor profundo e no nervo digital radial do quinto quirodáctilo esquerdo, após golpe durante prática de taekwondo. Realizada tenoneurrafia (seta).



Lesões tendíneas dos quirodáctilos - correlação da imagem com achados clínicos e cirúrgicos

Complexo extensor dos dedos

União dos tendões lateral/ medial - bandas lateral/ medial do tendão extensor + bandas laterais dos tendões intrínsecos

Capuz extensor

Banda sagital

Tendão extensor


Tendão terminal: junção das bandas conjuntas laterais

Banda central: inserção central na base dorsal da falange média

Tendão extensor da metacarpofalangeana: divide-se em uma banda central e duas laterais

Tendão interósseo


Lumbrical




Lesões tendíneas dos quirodáctilos - correlação da imagem com achados clínicos e cirúrgicos

(A,B,C) Masculino, 12 anos. Contusão no segundo quirodáctilo em jogo de futebol há poucos dias.

À ressonância magnética: lesão no tendão extensor terminal, junto ao marcador de queixa clínica. Deformidade de "dedo em martelo".





T1



T2 FAT SAT

(D,E,F,G) Masculino, 51 anos, queda de bicicleta. À ressonância magnética: deslocamento volar da interfalangeana distal (deformidade em botoeira), com lesão no tendão adjacente.



T2 FAT

T1 FAT PÓS GD

F

G

T2 FAT

T1 FAT PÓS GD